

核准日期：2006年06月18日  
修改日期：2007年10月24日  
2011年06月27日  
2011年07月01日  
2011年08月05日  
2019年12月01日  
2022年10月13日  
2023年08月31日

## 氯喹那多-普罗雌烯阴道片说明书 外

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

**【药品名称】**

通用名称：氯喹那多-普罗雌烯阴道片  
英文名称：Chlorquinadol Promestriene Vaginal Tablets  
汉语拼音：Lükuinaduo Puluocixi Yindaopian

**【成份】**

本品为复方制剂，每片含氯喹那多200mg，普罗雌烯10mg。

**【性状】**

本品为淡黄色片。

**【适应症】**

除淋球菌外，各种感染性病因引起的白带异常。

**【规格】**

每片含氯喹那多200mg，普罗雌烯10mg。

**【用法用量】**

将药片湿润后送至阴道深部，每晚1片，连续用18日，在月经期也连续用药。  
剂量可根据医嘱调整。

**【不良反应】**

罕见不良反应。只有极少数病人在治疗期间，尤其是在治疗初期，有局部刺激、瘙痒、或烧灼感，停药后症状自行消失。

**【禁忌】**

1. 虽然此药在应用过程中，没有发现全身性效应，但不提倡将此药应用于有雌激素依赖性疾病患者。  
2. 对本品过敏者禁用。

**【注意事项】**

有雌激素依赖性疾病的患者避免使用本药。

**【孕妇及哺乳期妇女用药】**

虽然本药极少经皮肤及粘膜吸收进入机体，也未见对孕妇及哺乳期妇女影响的临床报道，但孕妇及哺乳期妇女使用本品前应咨询医生。

**【儿童用药】**

未进行该项实验且无可靠参考文献。

**【老年用药】**

与成年人服用无差异。

**【药物相互作用】**

尚不明确。

**【药物过量】**

本品为局部外用药，极少量活性成分进入循环系统，在医嘱范围内，不易发生药物过量。如确系由过量使用本品出现不良反应者，应立即停药并及时寻求医生的指导。

**【药理毒理】**

本品是由氯喹那多和普罗雌烯组成的复方制剂。氯喹那多是一种广谱抗菌剂，对多种病原菌具有抑制作用。普罗雌烯是一种合成的不对称雌二醇二醚，研究提示，与传统的局部用雌激素制剂比较，普罗雌烯穿透明道或表皮上皮细胞的能力较差，全身吸收以及全身性刺激反应很小，局部用药时普罗雌烯具有抗阴道或宫颈粘膜萎缩的作用。

**【药代动力学】**

氯喹那多是一种接触性抗菌剂，由阴道粘膜部分吸收的成分很少，在阴道内不被代谢。局部用药的普罗雌烯不在组织内聚集，其生物半衰期小于24小时。在皮肤上施药后，只有少于1%的普罗雌烯本药被吸收，阴道用药后，从未观察到全身的刺激效应，尤其是距离阴道较远的雌激素敏感器官(如乳房和子宫)。

**【贮藏】**遮光、密闭、在干燥处保存。

**【包装】**铝塑包装，2片/板，1板/盒；6片/板，1板/盒、2板/盒、3板/盒。

**【有效期】**24个月

**【执行标准】**YBH16062006

**【批准文号】**国药准字H20065500

**【上市许可持有人】**

名 称：北京斯利安药业有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区运成街3号1号楼

**【生产企业】**

企业名称：北京斯利安药业有限公司

生产地址：北京市北京经济技术开发区运成街3号

邮政编码：100176

电话号码：010-67868885

传真号码：010-67860810